الجيب الأنفي الوتدي

يقع الجيب الأنفي الوتدي بالقرب من العين و المخ مما يجعل أمراض الجيب الوتدي تشمل خطورة اذا امتد المرض الى العين و المخ.

و من اهم اعراض اصابات الجيب الوتدي الصداع اساساً و قد يكون مصحوباً بانسداد في الأنف أو وجود مخاط خلف الأنف. و يتم تشخيص اصابات الجيب الوتدي باستخدام المناظير الضوئية و الأشعة المقطعية و الرنين المغناطيسي.

المشكلة عندما يكون الجيب الوتدي فقط مصاباً بدون أي اصابات أخرى للجيوب الأنفية، فتنسد فتحة الجيب و يتجمع المخاط وتتكاثر البكتيريا و تتكون اللحميات.

و من أهم اصابات الجيب الوتدي الالتهابات الفطرية و الأورام الحميدة و الأورام الخبيثة و تسرب سائل النخاع الشوكي.

و تتم جراحات الجيب الوتدي عن طريق فتحة الأنف الخارجية بدون جراحة خارجية أو فتحات في الوجه أو تحت الشفة، كما أنها من جراحات اليوم الواحد، و يمكن أجراؤها تحت تخدير عمومي أو موضعي.

الجراحة الحديثة هي استخدام المنظار الضوئي للوصول إلى الجيب الوتدي إما عن طريق الأنف مباشرة في حالة عدم اصابة الجيب الغربالي أو عن طريق الجيب الغربالي في حالة اصابته.

كما يمكن التعامل مع أورام الغدة النخامية عن طريق الجيب الوتدي.

ا.د. رضا كامل

استاذ امراض الأنف و الجيوب الأنفية

كلية الطب - جامعة القاهرة

زميل جامعة جون هوبكنز - امريكا